

APP PTI

Desarrollo de prototipos

Bienvenido!

INGRESAR

REGISTRARME

Ingresar

e-mail

contraseña

INGRESAR

[Olvido su contraseña?](#)

Registro

Nombre




Apellido



e-mail

Contraseña

[Acepto términos y condiciones](#)

REGISTRARME





ESTO LO TOMAMOS DEL FOLLETO DE NOVARTIS

REVOLADE® eltrombopag olamine

SI PREFERIS TOMAR REVOLADE® (eltrombopag olamine) POR LA NOCHE Tené en cuenta que hay ciertos alimentos que pueden afectar su correcta absorción. Durante las 4 horas previas y las 2 horas posteriores a la toma de Revolade® (eltrombopag olamine) evitá consumir:¹

- X productos lácteos (leche, yogurt, crema, quesos, manteca, helado)
- X jugos fortificados con calcio
- X antiácidos (que contengan cationes bivalentes, por ejemplo: aluminio)
- X suplementos minerales (hierro, calcio, magnesio, selenio y zinc)

Durante la cena, junto con la toma de Revolade® (eltrombopag olamine) podés consumir cualquiera de los alimentos servidos en el plato y acompañarlos con un jugo de frutas, agua, gaseosa, vino, etc.

Referencias: 1 Último prospecto aprobado por ANMAT.

REVC
(eltrombopag olamine)

